

中東呼吸器症候群 (マーズ) について

☆MERSコロナウイルスが原因の感染症です。2012年に初めて確認されました。

主に、アラビア半島やその周辺諸国で流行循環しています。それ以外の国では、中東地域で感染した人（輸入症例）もしくはその人と接触した人であることが分かっています。

☆日本での患者発生はありません。

☆ 下記（１）または（２）に該当する場合、神戸市保健所へご相談下さい。

（１）発症前14日以内にアラビア半島又はその周辺諸国から帰国した場合（①必須。②③のいずれかを満たす）

- ① 熱を伴う急性呼吸器症状（軽症の場合を含む）がある。
- ② 発症前14日以内に対象地域で医療機関を受診・訪問したことがある、
- ③ MERSの確定患者又はヒトコブラクダとの接触歴がある。

（２）発症前14日以内に帰国した場合（対象地域を問わない）（④必須。⑤⑥⑦⑧のいずれかを満たす）

- ④ 発熱又は急性呼吸器症状（軽症を含む）がある。
- ⑤ MERSが疑われる患者を診察、看護・介護した。
- ⑥ MERSが疑われる患者と同居していた。
- ⑦ MERSが疑われる入院患者と同じ病室・病棟に滞在した。
- ⑧ MERSが疑われる患者の気道分泌液・体液等の汚染物質と接触した。

※（１）（２）のいずれも、他の感染症又は他の病因によることが明らかでないこと

必ず神戸市保健所・予防衛生課に連絡して下さい（電話：078-322-6789）

★**感染経路**：ラクダ等のウイルス保有動物との接触。ラクダの未加熱肉や未殺菌乳の摂取。発症した人と濃厚接触した人との咳などによる飛沫感染や接触感染と考えられています。

★**潜伏期間**：2～14日間

★**症状**：発熱、咳、肺炎（急速に呼吸管理が必要となる場合もある）、下痢等の消化器症状、多臓器不全（特に腎不全）や敗血性ショックを伴う場合があります。

高齢者及び糖尿病、腎不全などの基礎疾患のある人で重症化する傾向があります。

★**治療方法**：有効な治療薬やワクチンはありません。

症状に応じた治療が行われます。

★**消毒**：アルコール消毒、次亜塩素酸ナトリウムが有効



☆あわてず、冷静に対応しましょう。

☆中東地域へ旅行する方へ・・・

渡航前に十分に情報収集しましょう。また、手洗い・うがい等の感染予防対策につとめましょう！

厚生労働省検疫所（FORTH） <http://www.forth.go.jp/news/2015/02021049.html>